

Novartis Norge AS
Consumer Health
N-0510 Oslo



**Otrivin 1 mg/ml nespray uten
konserveringsmiddel med mentol**

"Novartis"

Pakningsvedlegg

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Otrivin 1 mg/ml neseppray uten konserveringsmiddel med mentol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Otrivin med mentol brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 10 dager.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Otrivin med mentol er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Otrivin med mentol
3. Hvordan du bruker Otrivin med mentol
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Otrivin med mentol
6. Ytterligere informasjon

1. HVA OTRIVIN MED MENTOL ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemiddelet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Otrivin med mentol er en neseppray med avsvellende effekt. Den brukes til korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER OTRIVIN MED MENTOL

Bruk ikke Otrivin med mentol:

- hvis du er overfølsom (allergisk) overfor xylometazolinhydroklorid eller overfor mentol eller noen av de andre innholdsstoffene i Otrivin med mentol.
- dersom du har operert vekk hypofysen.

Vis forsiktighet ved bruk av Otrivin med mentol:

Otrivin med mentol skal ikke gis til barn under 10 år.

Personer som er følsomme overfor legemidler med adrenalinlignende effekt (f.eks adrenalin, efedrin) kan få bivirkninger som søvnforstyrrelser, svimmelhet, skjelvninger, hjertebank eller økt blodtrykk, og skal derfor kontakte lege før bruk av Otrivin med mentol.

Bruk av andre legemidler sammen med Otrivin med mentol

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Behandlingen med Otrivin med mentol kan bli påvirket dersom det brukes samtidig med trisykliske (f.eks klomipramin, amitriptylin) eller tetrasykliske (f.eks maprotilin)

antidepressiva. Ta derfor alltid kontakt med lege før du samtidig bruker preparater som inneholder disse forbindelsene.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Kan brukes av gravide og ammende kvinner.

Kjøring og bruk av maskiner:

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek

Dette legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. HVORDAN DU BRUKER OTRIVIN MED MENTOL

Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker vedrørende bruk av Otrivin med mentol.

Dosering



Voksne og barn over 10 år: 1 spray i hvert nesebor etter behov 2-3 ganger daglig.

Skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 10 dager. Annen dosering, slik lege har forskrevet.

Ved bruk i mer enn 10 dager sammenhengende kan Otrivin med mentol føre til tett nese.

Bruksanvisning

1. Puss nesen. Fjern plasthetten.
2. Sprayen plasseres mellom fingrene som vist på bildet. Det pumpes ved å trykke kraven ned mot flasken. Før sprayen tas i bruk første gang, pumpes et par ganger slik at løsningen kommer ut som en fin tåke. Sprayen er nå klar til bruk.
3. Len hodet litt forover. Sprayens spiss føres forsiktig opp i neseboret, og det pumpes én gang. Gjenta i det andre neseboret.



Dersom du tar for mye av Otrivin med mentol

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle andre legemidler kan Otrivin med mentol forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Vanlige (oppleves av flere enn 1 av 100 personer): Svie eller lokal irritasjon i nesene, tørr neseslimhinne.

Sjeldne (oppleves av færre enn 1 av 1000 personer): Hodepine, kvalme

Allergiske reaksjoner (hudutslett) og forbigående uklart syn er blitt rapportert i noen få tilfeller.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER OTRIVIN MED MENTOL

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Bruk ikke Otrivin med mentol etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Otrivin med mentol

Virkestoff er: xylometazolinhydroklorid 1 mg/ml.

Hjelpestoffer er: mentol, cineol, dinatriumedetat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid, sorbitol, makrogolglyserolhydroksystearat og rensset vann.

Inneholder ikke konserveringsmiddel.

Hvordan ser Otrivin med mentol ut og innholdet i pakningen

10 ml plastflaske med dosepumpe.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Novartis Consumer Health

Postboks 237 Økern

N-0510 Oslo

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent

2006-11-21