

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Otrivin 0,5 mg/ml og 1 mg/ml neseppray, oppløsning uten konserveringsmiddel Xylometazolinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Otrivin brukes med forsiktighet for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 10 dager.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Otrivin er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Otrivin
3. Hvordan du bruker Otrivin
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer
6. Ytterligere informasjon

1. HVA OTRIVIN ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskriving som er angitt på apoteketiketten.

Otrivin er Et middel som brukes lokalt i nesen. Den får blodårene til å trekke seg sammen og letter luftpassasjen ved tett nese ved forkjølelse. Legen kan også bruke preparatet ved bihulebetennelse og akutt mellomørebetennelse.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER OTRIVIN

Bruk ikke Otrivin:

- hvis du er overfølsom (allergisk) overfor xylometazolinhydroklorid eller et av de andre innholdstoffene i Otrivin. Ved noen typer operasjoner skal du ikke bruke Otrivin. preparatet skal ikke brukes ved betennelsestilstander i hud og slimhinner i nesehulen (gjelder ved andre typer betennelsestilstander enn ved forkjølelse og lignende) og ved skorpedannelser (rhinitis sicca) og ved grønn stær.

Vis forsiktighet ved bruk av Otrivin:

- ved høyt blodtrykk, hjerte-kar sykdom, sykdommer i skjoldbruskkjertelen, sukkersyke (diabetes mellitus) og hos pasienter som tar bromokriptin. Ved uriktig bruk og høy

dosering kan man få virkning ellers i kroppen, særlig gjelder dette barn. Otrivin bør ikke brukes sammenhengende mer enn i 10 dager. Det er fordi bruk over lengre tid kan føre til svelling av slimhinnen og nesen kan bli tett igjen ("rebound"-effekt).

Graviditet

Brukes med forsiktighet av gravide. Unngå høye doser og hyppig bruk. Bruk av anbefalte doser medfører liten risiko for fosteret. Kan benyttes under graviditet.

Amming

Virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Kan benyttes under amming.

Bilkjøring og bruk av maskiner

Legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Bruk av andre legemidler sammen med Otrivin

Rådfør deg med lege før samtidig bruk av legemidler mot depresjon. Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.

3. HVORDAN DU BRUKER OTRIVIN

Dosering

Nesespray 1 mg/ml:

Voksne og barn over 10 år: 1 spray i hvert nesebor 2-3 ganger daglig.



Nesespray 0,5 mg/ml:

Barn 1-10 år: 1 spray i hvert nesebor 2-3 ganger daglig.

Bør ikke brukes sammenhengende i mer enn 10 dager.

Bruksanvisning

1. Puss nesen. Fjern plasthetten.
2. Sprayen plasseres mellom fingrene som vist på bildet. Det pumpes ved å trykke kraven ned mot flasken. Før sprayen tas i bruk første gang, pumpes et par ganger slik at løsningen kommer ut som en fin tåke. Sprayen er nå klar til bruk.
3. Len hodet litt forover. Sprayens spiss føres forsiktig opp i neseboret, og det pumpes én gang. Gjenta i det andre neseboret.



Otrivin har en en-veis vakuumpumpe som hindrer at luften strømmer tilbake i flasken etter bruk. Dette er grunnen til at det ikke er nødvendig med konserveringsmidler. Dosepumpen har en beskyttelseshette med åpninger som tillater sprayrester å tørke ut, og forhindrer mikrobiell forurensning av den neste spraydosen.

Dersom du tar for mye av Otrivin

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle andre legemidler kan Otrivin ha bivirkninger. Bruk gjennom lengre tid kan føre til at nesen blir tett igjen. En brennende følelse i nese eller hals, lokal irritasjon eller tørrhet i neseslimhinnen, kvalme, hodepine kan forekomme. Allergireaksjoner eller forbigående synsforstyrrelser er rapportert i isolerte tilfeller. Hjerne-kar effekter er observert. Informer lege dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER OTRIVIN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 30°C.

Bruk ikke Otrivin etter utløpsdatoen som er angitt på flasken.

Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Otrivin

Virkestoff er: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg/ml og 1 mg/ml.

Hjelpestoffer er: natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, dinatriumedetat og renset vann.

Hvordan ser Otrivin med mentol ser ut og innholdet i pakningen

10 ml plastflaske med dosepumpe.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Novartis Norge AS, Consumer Health, Postboks 237 Økern, N-0510 Oslo

Tilvirker

Novartis Consumer Health AG, Nyon, Sveits

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent

2005-01-14