

## c Spersallerg Novartis

**Antihistamin + vasokonstriktor.**

TC-nr.: [S01G A52](#)

**T ØYEDRÅPER:** 1 ml *inh.*: Antazolin. chlorid. 0,5 mg, tetryzolin. chlorid. 0,4 mg, natr. chlorid. 8,9 mg, acid. hydrochloric. q.s., benzalkon. chlorid. 50 µg, hypromellos., aqua steril. ad 1 ml. 1 dråpe *inh.*: Antazolin. chlorid. 17 µg, tetryzolin. chlorid. 13 µg. Endosebeholdere uten konserveringsmiddel.

**Indikasjoner:** Allergisk konjunktivitt.

**Dosering: Voksne:** 1 dråpe i nedre konjunktivalsekk 1-4 ganger daglig. Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt.

**Kontraindikasjoner:** Glaukom med trang kammervinkel. Keratoconjunctivitis sicca.

**Forsiktighetsregler:** Det er risiko for utvikling av «rebound»-effekt ved vedvarende hyppig bruk.

**Graviditet/Amning:** Det er ingen erfaring vedrørende bruk av legemidlet under graviditet og amning.

**Bivirkninger:** En svak reduksjon av tåresekresjonen kan forekomme. I enkelte tilfeller, spesielt hos små barn, kan det forekomme hodepine, tretthet, slapphet og hjertebank.

**Egenskaper:** *Klassifisering:* Inneholder antazolin, et antihistamin, samt det vasokonstriktoriske stoffet tetryzolin. *Virkningsmekanisme:* Gir en hurtig og langvarig effekt ved å motvirke hyperemi i conjunctiva. Antazolin gir samtidig en antiallergisk virkning.

**Utlevering:** Øyedråper 10 ml og 20 × 0,3 ml er unntatt fra reseptplikt til behandling av øyeplager ved pollenallergi.

**Pakninger og priser:** 10 ml kr \*. 3 × 10 ml kr 264,50. 20 × 0,3 ml kr \*. 60 × 0,3 ml kr 264,50.

**Refusjon:** Se Refusjonslisten, [S01G A52](#).

**Sist endret:** 17.03