

Novartis Norge AS
N-0510 OSLO



Pakningsvedlegg

Vectavir® krem

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Vectavir® 1% krem Penciklovir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Vectavir brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 14 dager.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Vectavir er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Vectavir
3. Hvordan du bruker Vectavir
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Vectavir
6. Ytterligere informasjon

1. HVA VECTAVIR ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Vectavir er en krem som inneholder et virushemmende middel, penciklovir. Penciklovir forhindrer vekst av herpesvirus i celler.

Vectavir brukes ved behandling av tidlige tegn på munnsår (herpes labialis) forårsaket av Herpes simplex virus. Tidlige tegn på munnsår er lett gjenkjennelige og oppleves som en kløende, kriblende eller stikkende følelse og smerte som raskt utvikles til blemmer og sår. Behandling med Vectavir forkorter tiden for infeksjonen, smerten og tilhelingen med inntil ett døgn. For å få en effektiv behandling og minimalisere infeksjonstiden, bør behandling skje så tidlig som mulig. Kremen virker både når den påføres i tidlige og senere stadier av sår utviklingen.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VECTAVIR

Bruk ikke Vectavir krem

- hvis du er allergisk (overfølsom) overfor penciklovir, famciklovir eller et av de andre innholdsstoffene i Vectavir.

Vis forsiktighet ved bruk av Vectavir

Kremen skal kun benyttes ved sår på lepper eller i ansiktet. Kremen skal ikke benyttes på slimhinner som for eksempel på innsiden av munnen eller kjønnsorganene. Bruk ikke kremen i eller i nærheten av øynene.

Bruk ikke kremen hvis du tidligere har brukt Vectavir og følt deg utilpass.

Vectavir krem skal ikke brukes til barn under 12 år.

Dersom du har sterkt nedsatt immunforsvar (immunsystemet er kroppens forsvar mot infeksjoner) på grunn av f.eks AIDS eller at du har gjennomgått en transplantasjon, skal Vectavir ikke brukes uten nært samråd med legen og anbefales brukt kun etter legens anvisning.

Kontakt lege dersom du er usikker på om såret ditt er et munnsår eller hvis såret blir verre og ikke viser tegn på heling etter 4 dager.

Bruk av andre legemidler sammen med Vectavir

Rådfør deg med legen dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Det er ikke klarlagt om effekten av behandlingen kan påvirkes dersom Vectavir og andre legemidler brukes samtidig.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Graviditet

Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Vectavir, hvis du er gravid eller har grunn til å tro at du er gravid.

Amming

Det er ukjent om Vectavir går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Dette legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Vectavir

Dette legemiddel inneholder propylenglykol. Kan forårsake hudirritasjon.

3. HVORDAN DU BRUKER VECTAVIR

Voksne og barn over 12 år: Behandlingen skal påbegynnes så snart som mulig etter de første tegn til infeksjon (f.eks. kløe, stikkende følelse og smerte). En del mennesker merker ikke disse symptomene, men Vectavir krem har også effekt selv om den strykes på når blemmer/sår allerede er dannet.



1. Vask hendene før og etter at kremen strykes på.
2. Klem ut litt krem på en fingertupp.
3. Kremen smøres på annenhver time på dagtid i 4 dager.

Om behandlingstiden sammenfaller med et måltid, bør du stryke på kremen etter at du har spist så kremen ikke slikkes av. Om kremen er forsvunnet i løpet av en time, påføres kremen ytterligere en gang.

Fortsett å bruke kremen selv om såret ikke føles bedre med en gang. Det kan ta tid før kremen virker. Bruk kremen i 4 dager, eller så lenge legen har forskrevet.

Dersom du tar for mye av Vectavir

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Det er ikke sannsynlig at det oppstår alvorlige problemer selv om du har anvendt en stor mengde krem samtidig på huden. Det er ikke farlig å svelge kremen, men en viss irritasjon i munnen kan oppstå.

Dersom du har glemt å ta Vectavir krem

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du har glemt å ta Vectavir, påfør litt krem så fort du husker på det, og fortsett som før.

Dersom du avbryter behandling med Vectavir

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Vectavir forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Vanligst forekommende er en brennende og stikkende følelse eller følelsesløshet på det behandlede hudområdet. Disse bivirkningene er oftest av mild karakter. Hvis disse symptomene blir sjenerende eller hvis de er ubehagelige, slutt å benytte kremen og kontakt legen din.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER VECTAVIR

Oppbevares uttilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 30° C.
Må ikke fryses.

Bruk ikke Vectavir etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Bruk ikke Vectavir hvis du oppdager synlige tegn på forringelse

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Vectavir

- Virkestoff er penciklovir 10 mg/g.
- Hjelpetoffer er hvit vaselin, flytende parafin, cetostearylalkohol, propylenglykol, cetomakrogol 1000 og rensset vann.

Hvordan Vectavir ser ut og innholdet i pakningen

Hvit krem. Tilgjengelig i tuber på 2g (uten resept) og 5 g (reseptpliktig).

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Novartis Norge AS, Postboks 237 Økern, 0510 Oslo

Tilvirker

Novartis Pharma Produktions GmbH, Wehr/Baden, Tyskland

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent:

2006-11-10